

Przeciwwskazania

Terapia manualna, jak każdy zabieg leczniczy, w większości przypadków przynosi wiele pozytywnych efektów. Jednak ze względu na ingerencję w głębokie struktury ciała występują określone przeciwwskazania do jego wykonania.

Poniżej zamieszczamy listę przeciwwskazań do wykonania zabiegu, z którą należy się bezwzględnie zapoznać. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przeciwwskazań prosimy o wiadomość.

Lista Przeciwwskazań

Skóra twarzy:

- choroby dermatologiczne
- duże ciemne pieprzyki z nierównymi krawędziami, szybko rosnące guzy, duża ilość brodawczaków
- liszaje
- opryszczka
- przerwanie ciągłości naskórka, czyli wszystkie rany i ranki
- stany zapalne skóry (zarówno te alergiczne, jak i zakaźne)
- skóra mocno naczyniowa z patologicznie pękającymi naczynkami
- skóra poparzona, odmrożona, spierzchnięta
- trądzik krostkowy i ropny
- trądzik różowaty w fazie aktywnej
- przeciwwskazaniem są również zabiegi medycyny estetycznej przed upływem:
 - 2-4 tygodni od głębokiego peelingu
 - 3 tygodni od wprowadzenia botoksu
 - 1 miesiąca od wstrzyknięcia wypełniaczy
 - 6 miesięcy od wprowadzenia nici
 - 3-6 miesięcy od operacji w danej strefie

Jama ustna:

- stany ropne jamy ustnej, w szczególności migdałków
 - stany zapalne (szczególnie dziąseł)
 - świeże ekstrakcje zębów
 - zmiany ropne około zębowe
 - inne choroby w jamie ustnej (na przykład choroby gruczołów ślinowych)
-

Ogólnoustrojowe:

- chłoniak
- choroby nowotworowe
- ciąża
- ciężkie choroby serca
- ciężkie stany zapalne chorobowe wymagające specjalistycznego leczenia
- ciężkie stany alergiczne
- gorączka
- guzki niewiadomego pochodzenia
- nadciśnienie(nieuregulowane farmakologicznie, skaczące)
- nadczynność tarczycy(dotyczy masażu szyi)
- podejrzenie zawału mięśnia sercowego
- porażenie nerwu trójdzielnego lub jego gałęzi w fazie ostrej
- powiększone węzły chłonne
- stany po chirurgicznym leczeniu węzłów chłonnych
- stany grypowe
- tętniaki
- wady serca
- zaawansowana miażdżycy
- zakrzepica

UWAGA! Od zakończenia leczenia nowotworu złośliwego (niezależnie od umiejscowienia) musi minąć 2 lata, aby można się było poddać zabiegowi.
